

749

: 25

750

1.25

()

)

(

() ()

10-5

2

2

)

(110

)()%60-40

(3.1.1

20-10

100

60-30

() 200

-5 20 4-1)

2-1

() 100 (40 15

2

2

-2

(1.3)()

:

5

4

:

•

2

•

4-3

1 <

1 <

2

2

3

:

•

•

2

800-400

4-3

1 ≤

2

2

:

•

•

2

800-400

)

4-3

(

:

•

1

2

•

•

6-3

:

3



:

5

4

:

•

•

2

+

2-0.8

:

•

/

2

2

/

+

•

3

:

•

•

2

2-0.8

4-3

+

:

•

2

2

2

:

•

•

2

400-100

4-3

:

•

•

1

2

()

•

2

•

: .

. 6-3

3



()

)

2

(

(2) 2

2

2

4 (200-100)

4-2 ()

4

() :

() 2

(1)

(110-55) 20-10

2

12

()₂

20

()

2

7-3

" (1.18 1.3)

" "

Sodium cromoglicate

()

2

Salbutamol

·2

4 2 ()

5 2 ()

5 50 () ()

100 () ()

20 5 ()

(1.22) :

) QT :

(3) (

1 : ()

:

4 3 4-2 ()

4

100

4 3

8

4-3 2 12-6 4-3 2-1 6-2

250

() 100 (2-1) 200-100

500

() 200

4

) 100 () 200

() 200 (

4-3 (2-1) 200-100 ()

4-3 () 200 4-3 () 100

18

5 4 2.5

) 18

(

() :

()

Beclometasone dipropionate

) 50 ()

() 250 (

2 :

:

:

4-3 100 200 ()

200-100 4-2 100-50 (800-600)

4 250 500 ()

4 500

() :

)

) (

(2

() .

Theophylline and Aminophylline

100

300 200

10 25 ()

:

() :

(2) (5) :

1 :

(3)

:

4-3 200-100 12 ()

12 450-300 ()

()

(110-55) 20-10 .

82.5-27.5) 15-5

(

(20) ()

6 500 5

800 16-10 1 9

() .

:

Sodium cromoglicate

5 ()

:

(3) (2) :

:

4 10

8-6

4 5

:

Ipratropium bromide

20 ()

:

) :

(

:

80

40-20

40-20

12-6

3

20

6

4-3

3

: